

Dermoid sinus


Co to vlastně je

Tento defekt se může objevit kdekoliv v oblasti trupu, ale nejčastěji postihuje krční páteř. Tento problém byl poprvé popsán právě u rhodéského ridgebacka a naše plemeno je ním taky nejvíce zatíženo. Jelikož se jedná o dědičnou vadu, jedinci s DS nejsou používáni v oficiálním chovu. Podle toho, jak je tato vchlípenina, kterou si můžeme představit jako tenounký kanálek, hluboká, rozlišujeme několik typů DS.

- Typ I: Vchlípenina jde podkožím a celým svalem a k vazů je přichycené samotné dno vchlípeniny.
- Typ II: Dno vchlípeniny sahá přes podkoží až do svalů, k vazů je připojeno fibrózní spojkou, jakoby provázkem, který fixuje dno vchlípeniny k tomuto vazů.
- Typ III: Dno vchlípeniny sahá jen do podkoží.
- Typ IV: Vchlípenina prochází podkožím, svalem, vazem a dno vchlípeniny je přichyceno k obalu míchy (dura mater).
- Typ V: Zde už nejde o vchlípeninu ve formě kanálku, ale o prostou cystu


Příznaky

Štěňata RR s PP v České republice jsou ještě u chovatele podrobené odborné prohlídce poradcem chovu a všechny štěňata s PP by měli v rámci vakcinace a čipování podstoupit i prohlídku veterinárními, při kterých je drtivá většina DS odhalena. Sám zkušený chovatel pozná většinu DS již těsně po narození štěňat a podle rozsahu a zdravotního stavu štěněte se rozhodne, jak bude danou skutečnost řešit. K Vám se bez Vašeho vědomí štěně s DS téměř nemá šanci dostat. DS se většinou chová jako vazivová spojka mezi povrchem kůže vedoucí směrem k páteři. Po důkladné prohlídce je obvykle možné identifikovat vstup do kůže, který vypadá jako černá tečka pod kterou pak lze nahmatat onen vazivový proužek. Další příznaky se mohou lišit od takových, kde o DS krom pohmatu netušíte, přes nenápadný výtok až po formaci abscesů. U dermoidů vedoucích až do páteřního kanálu hrozí závažné neurologické poruchy.



Dermoid sinus nebo taky dermoidní cysta je tubulární defekt kůže, který se vytváří během embryonálního vývoje štěňátka nekompletním oddělením tkáně kožní od tkáně nervové.

MUDr. Petra Fedorová



Diagnostika

Při podezření na DS u vašeho psa je nezbytné navštívit veterinárního lékaře, který určí diagnózu pomocí pohmatu a následně provede vyšetření na RTG s kontrastní látkou, která pomůže zjistit rozsah DS. Ideální je vyšetření na CT nebo MRI, ty se provádějí na specializovaných pracovištích, kde je následně možné DS řešit.



Léčba

Léčba DS spočívá v jeho chirurgickém odstranění. To by měl provádět zkušený chirurg nebo neurochirurg vzhledem k možnosti, že bude nutné vstoupit do páteřního kanálu až k míše.

Vyhledky pacienta po úspěšném odstranění DS jsou velmi dobré v případech, kde ještě nebyly zaznamenány neurologické obtíže. U těchto pacientů je zvýšené riziko komplikací při zákroku a přetrvávání potíží i po operaci, které mohou zahrnovat chronické bolesti či neurologické deficity chůze.

Případ z veterinární praxe

Před rokem mě moje kamarádka požádala o radu s výběrem štěňátka RR. Moje rada zněla, aby si hlavně si vybrala štěně po pohodových a zdravých rodičích, od zkušeného chovatele ridgebacků s PP. Nejsem žádný „rasista“, ale dobře jsem věděla, proč jí to radím. Z jejich úst zazněl klasický argument, že nechťejí psa na výstavě, ale partáka do rodiny. Na příkazu původu nezálež!

Doporučila jsem jí teda ptát se po štěňátku s PP bez výstavních a chovatelských předpokladů – tzv. nestandardní štěně. Cena takového štěněte je srovnatelná s „bezpapírákem“, ale pořád s nějakou zárukou známých předků, odchovu a zdraví pejska. Jelikož poptávka po takových štěňátkách je docela vysoká, kamarádka podlehla inzerátu typu „prodám vymazlené štěňátko bez PP po rodičích s PP“ a pořídila štěně bez PP. Rok se s rokem sešel a milá fenečka se ocitla u mě na operačním stole. Diagnóza? Dermoid sinus! DS u ní vypadal jako malá nenápadná tečka na krku, kamarádka dokonce váhala, jestli je nutné ho odstranit, ale po tom, co z něj začala vytékat tekutina došla ke stejnému názoru a dohodly jsme se, že nebudeme riskovat komplikace a DS odstraníme. Malá tečka se pod úroveň kůže změnila v rozsáhlý tunel s vazivovými „chapadly“ do okolité tkáně, útvar byl plný chlupů a kožního mazu a jevil známky počínajícího zánětu. Vedl až na plochu druhého krčního obrátce, kde díkybohu končil a nepokračoval do oblasti míchy. Mnoho pacientů, ale takové štěstí nemá a DS zasahuje až na míšní obaly a míchu a způsobuje závažné neurologické potíže často končící smrtí. Fenka se našťástí po zákroku zotavila dobře.

Majitelé za operaci zaplatili cenu dalšího ridgebacka, nemluvě o stresu pro ně i pro pejska.

- MUDr. Petra Fedorová

